

CO POWODUJE GBS?

Przyczyna nie jest znana. Wiemy, że około 50% przypadków występuje wkrótce po infekcji (wirusowej lub bakteryjnej), nawet zwykłej grypie lub grypie żołądkowej. Niektóre teorie sugerują bodziec autoimmunologiczny, który powoduje, że układ obronny pacjenta pod postacią przeciwciał i białych krwinek rozpoczyna uszkodzanie mieliny (osłonki lub izolacji włókien nerwowych), co powoduje drętwienie i osłabienie siły mięśniowej.

JAK DIAGNOZUJE SIĘ GBS?

Dość często objawy i badanie fizykalne pacjenta są wystarczające do rozpoznania. Nagły początek (wstępującego) osłabienia siły mięśniowej z towarzyszącymi często zaburzeniami czucia dotyczącymi obydwu stron ciała, występuje często.

Często występuje zniesienie odruchów ścięgnistych, takich jak odruch kolanowy. W celu potwierdzenia rozpoznania można wykonać nakłucie łądźwiowe z oceną płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym stwierdzany jest podwyższony poziom białka oraz badania przewodnictwa nerwowego i reakcji mięśni na bodziec elektryczny.

ZGŁOŚ SIĘ DO **REJESTRU PACJENTÓW Z GBS|CIDP**, PODZIEL SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI I ODEGRAJ KLUCZOWĄ ROLĘ DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI WSZYSTKICH PACJENTÓW...
[HTTPS://GBS-CIDP.IAMRARE.ORG/](https://GBS-CIDP.IAMRARE.ORG/)

GBS może wystąpić u osoby w dowolnym wieku, bez względu na płeć i pochodzenie etniczne. Charakteryzuje się nagłym początkiem osłabienia siły mięśniowej i często porażeniem kończyn dolnych, górnych, mięśni oddechowych i twarzy.

JAK WYGLĄDA LECZENIE GBS?

GBS w początkowym etapie jest nieprzewidywalny, dlatego większość pacjentów z nowym rozpoznaniem wymaga hospitalizacji, z wyjątkiem przypadków o bardzo łagodnym przebiegu. Zazwyczaj nowe przypadki GBS są przyjmowane na oddział intensywnej terapii, aby monitorować oddech i inne parametry, do czasu stabilizacji choroby. Plazmaferesa (procedura „oczyszczania” krwi) oraz duże dawki immunoglobulin podawanych dożylnie często pomagają skrócić przebieg GBS. Ostra faza GBS trwa od kilku dni do kilku miesięcy, a u ponad 90% pacjentów przechodzi do fazy powrotu do zdrowia w ciągu czterech tygodni. Opiekę nad pacjentem sprawuje zespół składający się z neurologa, specjalisty fizjoterapii, internisty, lekarza rodzinnego, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, pracownika społecznego, pielęgniarki oraz psychologa lub psychiatry. Niektórzy pacjenci wymagają terapii logopedycznej, jeśli chorobą objęte są mięśnie odpowiedzialne za mowę.

MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA GBS|CIDP

Organizacja założona w 1980 roku przez Estellę oraz Roberta Bensonów w celu niesienia pomocy innym w walce z tą przerażającą i potencjalnie bardzo niebezpieczną chorobą, która nie zawsze kończy się pełnym powrotem do zdrowia. Fundacja ma ponad 182 oddziałów w Ameryce Północnej, Europie, na bliskim i środkowym Wschodzie, w Afryce, Australii, Nowej Zelandii i Holandii.

Jej celem jest wsparcie Ciebie, pacjenta z GBS, i Twojej rodziny. Fundacja jest dumna, że w jej radzie do spraw medycznych zasiadają światowej klasy eksperci w zakresie GBS oraz lekarze z rozpoznaniem GBS.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jeśli chorujesz na GBS lub znasz osobę z tą chorobą i potrzebujesz pomocy lub informacji, proszę skontaktuj się z Fundacją. Jeśli jesteś zainteresowany/-a stworzeniem oddziału lokalnej grupy wsparcia lub chcesz dowiedzieć się o lekarzach z Twojej okolicy, którzy mają doświadczenie z GBS, skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś pracownikiem opieki zdrowotnej i potrzebujesz naszej literatury lub wsparcia emocjonalnego dla swoich pacjentów, proszę skontaktuj się z nami. Jesteśmy tu dla Ciebie.

DOSTĘPNE USŁUGI

- Ośrodki doskonałości
- Odwiedziny osób wyleczonych u pacjentów
- Wyczerpujące broszury informacyjne dla wszystkich stadiów GBS|CIDP
- Pomoc dla pacjentów ze strony oddziału lokalnego lub światowego
- Kanały kontaktu w mediach społecznościowych
- Informacja o lekarzach z doświadczeniem w GBS
- Kwartalny biuletyn
- Fundowanie badań naukowych
- Działania doradcze pacjentów oraz sposoby zaangażowania
- Międzynarodowe sympozja edukacyjne dla medyków i ogółu społeczeństwa
- Zasoby online: odwiedź naszą stronę internetową: www.gbs-cidp.org